

البلوغ المبكر وأسبابه ومضاعفاته



الأحد 1 مايو 2016 07:05 م

البلوغ المبكر هو حالة تبدأ فيها علامات البلوغ بالظهور في وقت مبكر جداً وبعد البلوغ الذي يبدأ قبل عمر ثماني سنوات عند الإناث وقبل تسع سنوات عند الذكور بلوغاً مبكراً

وتظهر عند العديد من الأطفال بعض العلامات المبكرة لحدوث البلوغ، والتي تعرف بالبلوغ المبكر الجزئي، فقد يلاحظ عند بعض الإناث اللانثي تتراوح أعمارهن بين ستة أشهر وثلاث سنوات عادة، حدوث بروز للثدي يختفي لاحقاً أو قد يستمر من دون حدوث التغييرات الجسدية الأخرى للبلوغ

ويشمل البلوغ حدوث نمو سريع للعظام والعضلات، وتغير شكل وحجم الجسم، وظهور القدرة على الإنجاب

وليس بالإمكان معرفة سبب حدوث البلوغ المبكر في كثير من الأحيان، ونادراً ما ينجم ذلك عن الإصابة بحالات صحية معينة، مثل العدوى والاضطرابات الهرمونية والأورام أو الشذوذات الدماغية، ويتضمن علاج البلوغ المبكر عادة استعمال دواء لتأخير تطوره بشكل أكبر

الأعراض

يعد البلوغ مبكراً عند ظهور العلامات التالية قبل سن الثامنة عند الإناث، وقبل سن التاسعة عند الذكور:

عند الإناث:

نمو الثدي

بدء الحيض

عند الذكور:

تضخم الخصيتين والقضيب

نمو شعر الوجه (في منطقة الشاربين أولاً).

زيادة عمق الصوت

العلامات والأعراض التي قد تحدث عند الذكور أو الإناث:

نمو شعر العانة أو الشعر تحت الإبطن

تسارع وتيرة النمو

ظهور حب الشباب

ظهور رائحة للجسم مثل البالغين