

دراسة: تناول أدوية الاكتئاب مع المسكنات يسبب نزيف المخ



الخميس 16 يوليو 2015 12:07 م

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون كوريون، أن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب ومسكنات الألم مثل إيبوبروفين أو نابروكسين قد يرفع من خطر حدوث نزيف في الدماغ

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبي الأميركي "هلت داي نيوز"، ووجد الباحثون أن أكثر من 4 ملايين شخص من الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب لأول مرة، مع العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات) هم أكثر عرضة للنزيف داخل الجمجمة في غضون الشهر المقبل

وأشار الباحثون، في معرض أبحاثهم، إلى أن النزيف داخل الجمجمة يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ أو الموت

وإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في المسكنات بمفردها مثل الأسبرين، إيبوبروفين (موترين، أدفيل) ونابروكسين (أليف)، تسبب سيولة الدم

نوهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" على ملصقات تحذيرية من بعض مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مؤكدة أن هذه العقاقير قد تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

وأضاف الباحثون، أنه من المعروف أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية "المسكنات" يمكن أن تسبب نزيف المعدة والأمعاء لدى بعض الناس، مثل بعض أدوية الاكتئاب مثل البروزاك والزولوفت والجمع معها يسبب نزيف في المخ