

## تناول المضادات الحيوية قبل سن الثانية يزيد مخاطر البدانة



الأربعاء 1 أكتوبر 2014 12:10 م

حذرت دراسة طبية من أن الأطفال الذين يعالجون بكثرة بواسطة المضادات الحيوية قبل بلوغهم الثانية من أعمارهم، يواجهون خطر الإصابة بالبدانة في مراحل مبكرة من طفولتهم □

وأوضح الدكتور تشارلز بيلي أستاذ مساعد في طب الأطفال السريري في مستشفى "فيلادلفيا" الأمريكية، أن الإفراط في إعطاء المضادات الحيوية للأطفال في سن صغيرة قد يؤثر على هؤلاء الأطفال بالسلب، وفقاً لما نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل السجلات الصحية لنحو 65,000 طفل من الذين زاروا العيادات الطبية من عام 2001 وحتى 2013، ليتم متابعة هؤلاء الأطفال من الولادة حتى بلوغهم الخامسة، ليتم قياس الطول والوزن ومراحل النمو □

وقد وجد الباحثون أن 69% من الأطفال الذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية قبل بلوغهم الثانية كانوا أكثر عرضة بمعدل 2,3 للمعاناة من البدانة بالمقارنة بأقرانهم ممن تناولوا المضادات الحيوية بمعدلات أقل □

كما لوحظ أن الأطفال الذين يبلغون 4 أعواماً، كانوا أكثر عرضة بنسبة 11% للإصابة بالبدانة مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا هذه المضادات الحيوية □