

أهم التطعيمات الإضافية للرضع من سن شهرين لسنتين



الاثنين 7 أغسطس 2017 07:08 م

يتعرض أطفالنا أحياناً للإصابة ببعض الأمراض، التي لا تحميهم منها التطعيمات الإجبارية، التي يحصل عليها وذلك لضعف جهازه المناعي، لذلك نعطي أطفالنا جرعات من التطعيمات الإضافية لحمايتهم من بعض الأمراض الشائعة

أشهر الأمراض التي يعاني منها الرضع في أول ٣ شهور

تبدأ هذه التطعيمات من عمر شهرين وحتى دخول الطفل للمدرسة، ومن خلال هذا المقال عزيزتي "سوبرماما" نوضح التطعيمات الإضافية ومواعيدها

يحصل الطفل على الجرعة الأولى من التطعيمات التالية، عند بلوغه شهرين:
الروتا:

يطعم الطفل ضد فيروس الروتا، الذي يعد أشهر مسببات الإسهال عند الأطفال وأخطرها، ويكون هذا التطعيم عن طريق الفم

الأنفلونزا البكتيرية (HIB):

للقاية من الالتهاب الرئوي والالتهاب السحائي، وتعطى بالحقن العضلي في منتصف الفخذ

المكورات الرئوية (Pneumococci):

للقاية من الالتهاب الرئوي بالحقن العضلي في منتصف الفخذ

يحصل الطفل على الجرعة الثانية من التطعيمات التالية، في عمر أربعة أشهر:
عند إتمام الطفل أربعة أشهر، يأخذ الجرعة الثانية من التطعيمات السابقة: الروتا والأنفلونزا البكتيرية والمكورات الرئوية

يحصل الطفل على الجرعة الثالثة من التطعيمات التالية، في عمر ستة أشهر:
عند إتمام الطفل ستة أشهر، يأخذ الجرعة الثالثة من تطعيم الأنفلونزا البكتيرية والمكورات الرئوية

يحصل الطفل على الجرعة الأولى من التطعيمات التالية، بعد إتمام الطفل العام الأول من عمره:
الجديري المائي:

يؤخذ بالحقن تحت الجلد

الالتهاب الكبدي الوبائي:

يؤخذ بالحقن العضلي في منتصف الفخذ

يحصل الطفل على جرعات منشطة من التطعيمات التالية، بعد إتمامه عمر العام والنصف:

الأنفلوانزا البكتيرية

المكورات الرئوية

متى وكيف يمكنك تأجيل تطعيم طفلك؟

يحصل الطفل على الجرعات التالية، بعد إتمام الطفل عمر الستين:

الجرعة الثانية من تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي "أ"، بالحقن العضلي أعلى الذراع

الجرعة الأولى من تطعيم الحمى الشوكية، بالحقن تحت الجلد

وعند دخول الطفل المدرسة، يحصل على هذه الجرعات في عمر 4 إلى 6 سنوات:

الجرعة الثانية من تطعيم الحمى الشوكية

الجرعة الثانية من تطعيم الجدري المائي

جرعة منشطة للدرن (BCG) بالحقن تحت الجلد

التطعيم ضد الدرن، ويجب إجراء اختبار لمناعة الجسم ضد المرض قبل إعطاء هذا اللقاح

التطعيم ضد الأنفلوانزا الموسمية، مرة كل عام بدايةً من سن ستة أشهر