

طرق طبيعية لخفض درجة حرارة الرضيع دون دواء



الخميس 7 فبراير 2019 11:02 م

أعراض ارتفاع حرارة الرضيع :

احمرار خدود الرضيع

رعشة والشعور بالبرودة

زيادة معدل التنفس

إرهاق وعدم القدرة على اللعب

ارتفاع درجة الحرارة فوق 37.5 درجة مئوية عند قياسها بالترمومتر

ويمكن قياس حرارة الرضيع بوضع الترمومتر تحت الإبط لمدة دقيقتين وزيادة نصف درجة على قراءة الترمومتر من تحت الإبط، فإذا كان الترمومتر يشير إلى 37.5 من تحت الإبط فذلك يعني أن درجة حرارة الرضيع 38 درجة مئوية

أسباب ارتفاع حرارة الرضيع:

قد ترتفع درجة حرارة الرضيع لأسباب عديدة، منها:

ارتفاع حرارة الرضيع بعد التطعيم

من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة الرضيع بعد التطعيمات، وهذا دليل على فعالية التطعيم واستجابة جهاز الطفل المناعي له، وغالبًا ما يكون ارتفاعًا بسيطًا لا يتعدى 38 درجة مئوية ولا يستمر لأكثر من يومين

ارتفاع حرارة الرضيع عند التسنين أحد أعراض التسنين ارتفاع درجة الحرارة، وعادة ما يكون ارتفاعًا بسيطًا لا يتعدى 38.5 درجة مئوية،

ويصاحبه كثرة اللعب وانزعاج الطفل وكثرة بكائه، وتبدأ فترة التسنين من عمر 4 أشهر إلى عمر 3 سنوات

ارتفاع حرارة الرضيع بسبب كثرة الملابس

من أشهر أسباب ارتفاع درجة الحرارة في الشهور الأولى من عمر الرضيع، كثرة الملابس وعدم ملاءمتها لدرجة حرارة الجو

وصحيح أن الرضيع يشعر بالبرد أكثر وأسرع من الأطفال الأكبر سنًا، ولكن بعض الأمهات يبالغن في طبقات الملابس لأطفالهن ما يؤدي

إلى ارتفاع درجة الحرارة، استشير طبيبك عن الملابس المناسبة لدرجة حرارة الجو

ارتفاع حرارة الرضيع بسبب عدوى أي عدوى يتعرض لها الرضيع قد تسبب له ارتفاعًا في درجة الحرارة سواء كانت عدوى فيروسية أو

بكتيرية، مثل أضرار البرد والإنفلونزا والنزلات المعوية وغيرها، وهنا يجب استشارة الطبيب ليشرح السبب ويصف العلاج المناسب

علاج ارتفاع الحرارة عند الأطفال في المنزل

قبل أن تبدئي في علاج طفلك في المنزل، تأكدي أولاً من ارتفاع درجة الحرارة بالترمومتر قبل إعطائه أي علاج، ولا تعتمد على شعورك فقط

ضعي كمادات مياه فاترة لطفلك تحت الإبط وعلى الفخذين، وتجنبي وضع الكمادات على البطن

ضعي طفلك تحت مياه فاترة لطفلك تحت الإبط وعلى الفخذين، وتجنبي وضع الكمادات على البطن

ارتفعت درجة حرارته فوق 38.5 درجة مئوية

استخدمي كمادات الجل المناسبة للرضع التي تباع في الصيدليات، وضعيها على كتف رضيعك وفخذه

أعطي لطفلك خافضًا للحرارة مناسبًا لعمره ووزنه، مثل الباراسيتامول، واستشير الطبيب إذا كنت لا تعرفين الجرعة المناسبة

أذهبي بطفلك إلى الطوارئ إذا وصلت درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية، رغم تطبيقك للخطوات السابقة

استشير الطبيب في أقرب فرصة، ليحدد سبب ارتفاع درجة الحرارة ويصف لطفلك العلاج المناسب

علاج ارتفاع الحرارة عند الأطفال بالخل

يظن البعض أن وضع الخل على ماء الكمادات يساعد على خفض درجة الحرارة بسرعة، ويرجع ذلك إلى سرعة تطاير الخل التي تسبب برودة

تساعد في خفض درجة الحرارة، ولا ينصح باستخدامه للأطفال لأنه قد يسبب تهيج والتهاب في الجلد نتيجة لحساسية جلد الرضيع

